

Appendix 4: Abstracts in Arabic

تقييم تأثير مرض فايروس كورونا (كوفيد-19) على الصحة النفسية للاردنيين, و تقدير رضا الجمهور عن استعداد

الصيدلة المجتمعيين للسيطرة على الجائحة.

برنامج الدراسة - الجزء الأول :

نبذة مختصرة:

على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يكون لتقشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تأثير كبير على الصحة النفسية للسكان الأردنيين ، إلا أنه كانت هناك دراسات قليلة للتحقيق في طبيعة وحجم التأثير.

تهدف هذه الدراسة الى تقييم الاضطرابات النفسية المحتملة التي يسببها الوباء الحالي وتقييم عوامل الخطر ذات الصلة.

على مدى ثلاثة اشهر (أغسطس إلى أكتوبر 2020) أجري هذا البحث بالاعتماد على دراسة مستعرضة وطنية قائمة

على المسح في 12 محافظة في الأردن: عمان ، إربد ، عجلون ، جرش ، المفرق ، البلقاء ، الزرقاء ، مادبا ، الكرك ،

الطفيلة ، معان ، والعقبة باستخدام عينات عشوائية متناسبة. تمت الإجابة على الاستبانة من خلال مقابلات وجهًا لوجه

مع عينة تم اختيارها عشوائيًا من السكان البالغين 18 عامًا فما فوق، لجمع البيانات من 1820 فرد عبر مناطق العاصمة

والوسط والشمال والجنوب الأردن, حيث تم استعمال "مقياس كسلر" للاضطرابات النفسية و التعديل عليه بما يتناسب

مع جائحة مرض فيروس كورونا المستجد. قام بالتحقق من صحة المقياس المعدل لجنة متخصصة تتألف من طبيب

نفسى ، مستشار أمراض معدية ، وصيدلي إكلينيكي و استخدمنا برنامج SPSS V26 لتحليل البيانات.

أشارت النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه بسبب تقشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، كان 11.4% من المشاركين

يعانون من اضطرابات نفسية شديدة ، و 25.4% اضطرابات نفسية معتدلة ، بينما كان 34.7% أصحاء بدون أي مشاكل

نفسية. 5.5% شعروا بالتعب المستمر ، 8.6% شعروا بالتوتر ، و 7% شعروا دائما باليأس. شعر 25.4% بالقلق في معظم

الأوقات ، وكان 21.8% قلقين بشأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية للعدوى أكثر من القلق من العلاج والحجر الصحي.

متنبئات البحث ذات العلاقة مع التداعيات النفسية الشديدة هي ؛ اصحاب الدخل الشهري الأقل من 500 دينار لأردني

{OR: 2.4, 95%CI: 1.45-4.96, العمل عن العاطلين عن العمل, p=0.01}

{OR: 1.9, 95%CI: 1.13-3.63, p=0.03} . مرض السكري. p=0.001

تمت التوصية بالتدخلات النفسية والاقتصادية المناسبة لتحسين الاستعداد العقلي للأوبئة بين السكان في الأردن كذلك اقتراح ابتكار بروتوكولات للتعامل مع الطوارئ من الناحية النفسية.

برنامج الدراسة - الجزء الثاني:

نبذة مختصرة:

لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 تم توسيع أدوار صيادلة المجتمع في العديد من البلدان ، وبالنظر إلى ندرة المعلومات المتعلقة بالرضا العام فيما يتعلق بتأهب الصيدلة والخدمات أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد في الأردن ، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم رضا الجمهور عن استعداد صيادلة المجتمع للوباء وخدمات تثقيف المرضى المقدمة ، بالإضافة إلى التحقق في التوقعات العامة لأدوار الصيادلة في حالات الطوارئ المستقبلية.

تم استخدام استبانة للدراسة المقطعية لجمع البيانات من 1820 بالغاً عبر 12 محافظة من محافظة الأردن باستخدام عينات عشوائية متناسبة. لتجنب الاتصال بالباحث / السكان ، تم تسليم الاستبيان إلكترونياً خلال المقابلات وجهاً لوجه لجمع عينة الدراسة. تم التحقق من صحة الاستبانة المعدلة من قبل لجنة متعددة التخصصات شملت أخصائي الصحة العامة ، واستشاري الأمراض المعدية ، وصيدلي إكلينيكي. بعد جمع العينة استخدمنا SPSS V26 لتحليل البيانات.

لجمع العينة المستهدفة ، تم الاتصال بـ 1820 فرد ، منهم 53.4% راضون عن خدمات الصيدلة في الأردن خلال COVID-19 وافق 29.4% ووافق بشدة 22.6% على أنه خلال الإغلاق قدمت الصيدليات في الأردن خدمة توصيل للمنازل سريعة وفعالة ، لكن 85.9% قالوا إن الدفع عن بعد ليس متاحاً دائماً. فيما يتعلق بازدهام العملاء داخل الصيدلية ، وافق 52.9% ووافق 22.9% بشدة على عدم ازدهام العملاء ، على الرغم من أن 83.5% من المشاركين اعتقدوا أن الصيدلة لم يولوا اهتماماً لاعطاء تعليمات حول COVID-19 خاصة بالمسنين ، أو 84.0% لأصاب الأمراض المزمنة. اعتقدت الغالبية العظمى ، 89.0% من المشاركين المشمولين ، أن الصيدلة يلعبون دوراً رئيسياً في إدارة

الوباء ، واعتقد 53.7 ٪ أنه يجب على الصيادلة مراقبة علامات COVID-19 لدى المرضى و تحسين أدويتهم ، كذلك
اعتقد 80.6 ٪ ان الصيادلة قادرين على الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها .

أيّد 55.9 ٪ أن صيديات المجتمع يجب أن تكون نقاط اعطاء لقاح فيروس كوفيد-19 ، بينما لم يوافق 64.1 ٪ على
اجراء الصيادلة في الأردن فحوصات اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR لاختبار الحالات المشتبه بإصابتها
بـ COVID-19 .

تمت التوصية بمراجعة وتحديث سياسة ممارسة الصيدلة ، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للجمهور أثناء الأوبئة.